

Diese Liste wurde nach besten Wissen und Sorgfalt erstellt und überprüft. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernommen werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Name	Gruppe	Dosierung	Einnahme	Lagerung
Aptivus® (Tripranavir)	PI	2x tägl. 500 mg (2 Kaps.) geboostert mit 2 x tägl. 2 Kps. RTV (200 mg)	Zu den Mahlzeiten	2-8 °C , nach dem Öffnen der Packung bei 25°C 60 Tage haltbar
Atripla® (Efavirenz, EFV, Emtricitabin FTC, Tenofovir TDF)	NNRTI/ NRTI	1x tägl.	Nüchtern, vor dem Schlafengehen	Flasche dicht verschlossen; vor Feuchtigkeit geschützt
Biktarvy® (Biktegravir, Tenofovirafenamid, Emtricitabin)	INSTI/NRTI	1xtägl	Unabhängig von den Mahlzeiten	Flasche dicht verschlossen; vor Feuchtigkeit geschützt
Celsentri® (Maraviroc)	CCR5-Inhibitor	2x tägl. 150mg 2x tägl. 300mg (Standard) 2x tägl. 600mg	Unabhängig von den Mahlzeiten	Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
Combivir® (AZT + 3TC)	NRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (300 mg AZT + 150 mg 3TC)	Unabhängig von den Mahlzeiten	Nicht über 30°C lagern.
Delstrigo® (Tenofoviridisoproxil, Lamivudin, Doravirin)	NRTI,NNRTI	1xtägl	Unabhängig von den Mahlzeiten	In Originalflasche aufbewahren; vor Feuchtigkeit schützen.
Descovy® (Tenofovirafenamid, Emtricitabin)	NRTI	1xtägl	Unabhängig von den Mahlzeiten	In Originalflasche aufbewahren; vor Feuchtigkeit schützen.
Dovato® (Dolutegravir, Lamivudin)	INSTI/NRTI	1xtägl	Unabhängig von den Mahlzeiten	Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
Emtriva® (Emtricitabin, FTC)	NRTI	1 x tägl. 1 Kps. (200 mg)	Zu den Mahlzeiten oder Unabhängig von den Mahlzeiten	Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
Epivir® (Lamivudin, 3TC)	NRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (150mg) oder 1 x tägl. 1 Tabl. (300 mg)	Unabhängig von den Mahlzeiten	Nicht über 30°C lagern; In Originalverpackung aufbewahren.
Eviplera® (Rilpivirin, Emtricitabin, Tenofoviridisoproxil)	NNRTI/NRTI	1xtägl	Zu den Mahlzeiten	Flasche dicht verschlossen; vor Feuchtigkeit geschützt
Fuzeon® (Enfuvirtid, T-20)	FI	2 x tägl. 1 ml Lsg. (= 90 mg) s. c. wenn > 42.6 kg	Spritzen an verschiedenen Stellen setzen, um Knotenbildung zu minimieren / zu verteilen	RT Zubereitete Lösung bei 2-8°C 24 Stunden haltbar

Genvoya® (Elvitegracir, Cobicistat, Tenofovirafenamid, Emtricitabin)	INSTI/c/NRTI	1xtägl.	Zu den Mahlzeiten	Flasche dicht verschlossen; vor Feuchtigkeit geschützt
Intelligence® Etravirin	NNRTI	2 x tägl. 2 FTA (200mg)	Nach den Mahlzeiten	In Originalflasche aufbewahren; vor Feuchtigkeit schützen.
Isentress® (Raltegravir)	INSTI	2 x tägl. 1 FTA (800mg)	Unabhängig von den Mahlzeiten	In Originalflasche aufbewahren; vor Feuchtigkeit schützen.
Juluca® (Dolutegravir/ Ralpivirin)	INSTI/NNRTI	1xtägl.	Unabhängig von den Mahlzeiten	In Originalflasche aufbewahren; vor Feuchtigkeit schützen.
Kaletra® (Lopinavir + Ritonavir, LPV + RTV)	PI	2 x tägl. 2 Fta (200 mg Lopinavir + 50 mg Ritonavir)	Unabhängig von den Mahlzeiten	Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingunge n erforderlich.
Kivexa® (ABC + 3TC)	NRTI	1 x tägl. 1 Tabl. (600 mg ABC + 300 mg 2TC)	Unabhängig von den Mahlzeiten	Nicht über 30°C lagern; In Originalverpackung aufbewahren.
Norvir® (Ritonavir, RTV)	PI	2x tägl. 600 mg (6 Kps.) oder in Kombinationstherapie mit anderen PI's 2x tägl. 100 - 300 mg (1- 3 Kps.)	Zu den Mahlzeiten, Therapie einschleichend beginnen 1. Tag 2 x 3Kps. (300 mg) 2.-3. Tag 2 x 4 Kps. (400 mg) 4. Tag 2 x 5 Kps. (500 mg) dann 2 x 6 Kps. (600 mg)	Kps.:2-8 °C, max. 7 Tage auch bei RT FTA: RT
Odefsey® (Ralpivirin, Emtricitabin, Tenofovirafenamid)	NRTI/NNRTI	1xtägl.	Unabhängig von den Mahlzeiten	Flasche dicht verschlossen; vor Feuchtigkeit geschützt
Pifeltro® (Doravirin)	NNRTI	1xtägl.	Unabhängig von den Mahlzeiten	In Originalflasche aufbewahren; vor Feuchtigkeit schützen.
Prezista® (Darunavir, DRV)	PI	2x täglich 1 Fta (600mg) geboostert mit 2x tägl. 1 Kps Norvir oder First-Line 1x täglich 2 Fta (400mg) geboostert mit 1x tägl. 1 Kps Norvir	Zu den Mahlzeiten	Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingunge n erforderlich.
Retrovir® (Zidovudin, AZT)	NRTH	2x tägl. 250 mg (1 Tabl.) oder 2x tägl. 300 mg (1 Tabl.)	Unabhängig von den Mahlzeiten	Nicht über 30°C lagern; In Originalverpackung aufbewahren.

Reyataz® (Atazanavir, ATV)	PI	1x tägl. 400 mg ungeboostert (2 Tabl.a 200 mg) 1x tägl. 300mg geboostert mit 100mg Ritonavir (2 Tabl. a 150 mg) je nach Kombination ist auch Einsatz von 1x tägl.400 mg geboostert (2 Tabl. A 200mg) möglich	Zu den Mahlzeiten	Nicht über 25°C lagern
Sustiva® (Efaviranz, EFV)	NNRTI	1x tägl. 600 mg (3 Kps. a 200 mg) oder 1x tägl. 600 mg (1 Kps. a 600 mg)	Einnahme vor dem Schlafengehen 2 h nach dem Essen (generell 2 h Abstand zum Essen)	Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
Stribild® (Dolutegravir/ Tenofovir, Emtricitabin/ Cobicistat	Integrase-inhibitor/ NRTI/PK-Enhancer	1 x tägl.	zu einer Mahlzeit	Flasche dicht verschlossen; vor Feuchtigkeit geschützt
Symtuza® (Darunavir, Cobicistat, Emtricitabin, Tenofovirafenamid)	PI/c/NRTI	1xtägl.	zu einer Mahlzeit	Flasche dicht verschlossen; vor Feuchtigkeit geschützt
Telzir® (Fosamprenavir)	PI	2 x tägl. 1 Tabl. (700 mg) geboostert mit 2 x tägl. 1 Kps. RTV (100 mg)	Unabhängig von den Mahlzeiten	Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
Trizivir® (AZT + 3TC + ABC)	NRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (300 mg ATZ + 150 mg 3TC + 300 mg ABC)	Unabhängig von den Mahlzeiten	Nicht über 30°C
Truvada® (TDF + FTC)	NRTI	1 x tägl. 1 Tabl. (300 mg TDF + 200 mg FTC)	zu einer Mahlzeit	Flasche dicht verschlossen; vor Feuchtigkeit geschützt
Tybost (Cobicistat)	PK-Enhancer (Booster)	1 x tägl.	zu einer Mahlzeit	Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
Viramune® (Nevirapin, NVP)	NNRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (200 mg)	Einnahme mit Flüssigkeit Unabhängig von den Mahlzeiten Therapie einschleichend beginnen: 14 Tage 1 x tägl. 1 Tabl. (200mg), dann 2 x tägl. 1 Tabl. (200 mg), sonst keine Hinweise	Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Viread® (Tenofovir, TDF)	NRTI	1 x tägl. 1 Tabl. (245 mg)	Zu den Mahlzeiten	Flasche dicht verschlossen; vor Feuchtigkeit geschützt
Ziagen® (Abacavir, ABC)	NRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (300 mg) oder 1 x tägl. 2 Tabl. (600 mg)	Unabhängig von den Mahlzeiten	Nicht über 30°C